



Ministerio de
Salud

Gobierno de Chile

Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico

Departamento de Epidemiología
Ministerio de salud
Abril 2021

¿Qué es?

SIMp

o


PIMS

Síndrome Inflamatorio Multisistémico
pediátrico

Pediatric Inflammatory Multisystemic
Syndrome

Síndrome que afecta a niños de distintas edades, pero habitualmente mayores de 5 años, y que se manifiesta entre 2 a 6 semanas luego de haber estado contagiado de coronavirus.

¿Qué sucede en Chile y en las Américas?



Las Américas

País/Territorio	Número de casos confirmados	Número de fallecidos confirmados
Argentina	125	1
Bolivia	1	1
Brexit	769	47
Brasil	1	1
Canada	55	1
Chile	157	2
Costa Rica	36	0
Colombia	4	1
Cuba	1	0
Ecuador	8	0
El Salvador	19	0
Estados Unidos de América	2.071	30
Guatemala	4	0
Honduras	2	0
Guayana Francesa	1	0
Haití	2	0
Paraguay	81	2
Paraguay	63	1
Perú	1	0
República Dominicana	129	0
Total	3.926	95

Total de países

20

Total de casos


3526

Fallecidos

2,7%

95 casos

Chile






Total de casos

174

Fallecidos


1,7%

3 casos



¿Por qué se produce?

- ✓ Se produce por una respuesta exagerada del sistema inmunitario del organismo asociada a COVID-19.
- ✓ Provoca un cuadro inflamatorio generalizado
- ✓ Si no se trata puede llegar a provocar complicaciones cardíacas.



¿Cuáles son los signos y síntomas?



Síndrome Inflamatorio Multisistémico pediátrico (PIMS)

- ✓ DOLOR DE CABEZA
 - ✓ FIEBRE
 - ✓ DESMAYO
 - ✓ GANGLIOS INFLAMADOS
 - ✓ EDEMA EN LOS LABIOS
 - ✓ EXANTEMA O RONCHAS EN LA PIEL
 - ✓ CONJUNTIVITIS
 - ✓ DIFICULTAD RESPIRATORIA O TOS
 - ✓ HINCHAZÓN EN MANOS Y PIES
 - ✓ VÓMITOS, DOLOR ABDOMINAL Y DIARREA
- 

¿Tiene tratamiento?



Si tiene tratamiento.



El niño deberá ser hospitalizado y recibirá medicamentos especializados.



Si la consulta es oportuna el niño puede evolucionar bien y tendrá una rápida recuperación



¿Cómo prevenir?

Para prevenir SIM se debe prevenir la infección por CORONAVIRUS.
Se puede hacer una pesquisa y consulta precoz para evitar complicaciones

Prevención
contagio
Coronavirus

PLAN DE ACCIÓN
CORONAVIRUS
COVID-19



- Lavado de manos** mínimo 20 segundos con agua y jabón.
- Estornudar o toser con el antebrazo** o en un pañuelo desechable.
- Mantener una distancia mínima de 1 metro** entre usted y cualquier persona que tosa o estornude.
- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.**
- No compartir bombilla, vaso** o cubiertos con otras personas.
- Evitar saludar con la mano o dar besos.**


¿Qué hacer si sospecho de SIM en un niño?



Consultar al centro de salud para el diagnóstico médico.

En resumen , qué debo educar...

- ✓ Prevenir COVID-19, con las medidas básicas: mascarilla, distanciamiento social, higiene de manos.
- ✓ En caso de sospecha de COVID-19 asistir al centro de salud y evitar el contacto con otras personas.
- ✓ Estar atentos a los signos y síntomas de SIM.
- ✓ Cumplir con las medidas sanitarias del Plan Paso a Paso.





Ministerio de
Salud

Gobierno de Chile

**CHILE LO
HACEMOS
TODOS**